

Plaga: CONEJOS COLA DE ALGODÓN DEL ESTE



1
Conejo
cola de
algodón del
este



2 y 3
Daño y heces de
conejo

CULTIVOS AFECTADOS

- La mayoría de los cultivos de hortalizas: los favoritos incluyen guisantes, frijoles, lechuga y hojas de remolacha.
- Muchos cultivos frutales: los favoritos incluyen primordios y tallos de frambuesas y arándanos, corteza de árboles y árboles jóvenes.
- En general, los conejos evitan los espárragos, las cucurbitáceas, las solanáceas, el maíz, la cebolla y las hierbas aromáticas fuertes. Evitar estos cultivos depende de la disponibilidad de otras fuentes de alimentos.
- Los conejos pueden sustentarse de pastos, tréboles, y otras malezas comunes.

DAÑO

- Daño de corte limpio en un ángulo de 45 grados en plantas bajas.
- El daño ocurrirá desde el nivel del suelo hasta aproximadamente 2½ pies sobre el suelo. El daño de invierno puede ocurrir a más de 3 pies debido a la nieve acumulada.
- Corteza masticada en árboles/arbustos jóvenes. Marcas de mordiscos de alrededor de 1/8 de pulgada.



4
Camada de conejos
en túnel alto

DESCRIPCIÓN

- Clasificado como lagomorfo, no como roedor.
- Tiene dos juegos de incisivos superiores, uno detrás del otro.
- Su pelaje es marrón grisáceo con una cola blanca pequeña y copetuda.
- Excrementos del tamaño de un guisante son otra señal de que hay conejos.

CICLO VITAL

- Los conejos no hibernan.
- Las hembras tienen un promedio de 3 camadas por año, promediando 5 crías por camada.
- La temporada de apareamiento generalmente ocurre de enero a agosto.
- Nacimientos ocurren en un nido poco profundo excavado en el suelo, forrado con piel y cubierto con vegetación. Los lugares cálidos y protegidos, como invernaderos de túneles altos, son objetivos ideales.

HÁBITAT

- Prefieren áreas abiertas de césped concubierta de hierbas y plantas mixtas, pero son muy adaptables.
- Usan lechos sobre el suelo, no madrigueras, por lo general entre hierbas, vegetación siempre verde, setos densos, matorrales de zarzas y debajo de terrazas.
- Son activos día y noche, mayormente al amanecer y al anochecer.

Plaga: CONEJOS DE COLA DE ALGODÓN DEL ESTE



5

Los conejos de cola de algodón del este tienen una cabeza oblonga con orejas largas y ojos grandes.



6

Los cálidos invernaderos de túneles altos son ideales para anidar.

ESTRATEGIAS DE GESTIÓN

Modificación del hábitat

- Retire apilados de madera, las áreas cubiertas de maleza y apilados de piedra del paisaje.
- Recorte las ramas bajas de hoja perenne.
- Cierre áreas debajo de terrazas y cobertizos.
- Dele la bienvenida a depredadores naturales como halcones, búhos, zorros, visones, comadrejas y serpientes a su paisaje.

Exclusión

- Use una malla de acero galvanizado de 1 pulgada o $\frac{1}{2}$ pulgada de espesor de 3 pies de alto, enterrada 3 pulgadas en el suelo.
- Coloque una malla de alambre alrededor de plantaciones de árboles o arbustos jóvenes, 3 pies por encima del nivel del suelo.
- Nota: Talla de $\frac{1}{4}$ a $\frac{1}{2}$ pulgada también lo protegerá contra los daños causados por ratones y campañoles, pero tendrá mayor costo.

Dispositivos ahuyentadores

- Existen rociadores activados por movimiento; sin embargo, no hay investigaciones que respalden su eficacia en conejos.
- Variar la posición, apariencia, duración o frecuencia de un dispositivo ahuyentador puede extender su efectividad.
- Los perros que persiguen pueden ser efectivos cuando están presentes y deben ser entrenados para evitar cavar y perturbar los cultivos.

Repelentes

- Los repelentes deben estar etiquetados para su uso en el (los) cultivo(s); revise la etiqueta.
- Los repelentes de sabor, incluidos los productos con capsaicina (pimiento picante), pueden ser efectivos. Rocíe todo el material vegetal accesible y vuelva a aplicar sobre un nuevo crecimiento.
- Los repelentes de olores, incluidos los productos con jabones de amonio o ácidos grasos altos como ingrediente activo, son una opción.
- La efectividad de los repelentes es variable dependiendo de otras fuentes de alimentos disponibles y aplicaciones consistentes y oportunas. Tanto los repelentes de sabor como de olor deben volver a aplicarse después de la lluvia.

Captura

- Consulte con las leyes locales con respecto a la captura y reubicación.
- Seleccione una trampa con una puerta de al menos 7 pulgadas de alto. Use cebos como zanahorias, lechuga, repollo o manzanas frescas/secas.
- Coloque la trampa en un área en la que los conejos hayan estado comiendo o descansando.
- Camufle la trampa para proporcionar la apariencia de una cubierta natural.

Cuando use productos pesticidas, asegúrese de que el producto esté etiquetado para el organismo en el que se quiere usar, así como para el tipo de planta que se va a tratar. Cuando use pesticidas, ya sean orgánicos o sintéticos, siga las instrucciones en la etiqueta. La etiqueta es la ley.